Bacillol® 30 Foam

Přípravek na rychlou dezinfekci citlivých povrchů.

Ochrana personálu a pacientů je prvořadým cílem našeho vědeckého přístupu, který je založen na komplexním testování účinnosti, zkoumání infekčních rizik a rozvoji kvality našich produktů a účinných preventivních metod.

Výzkumem k prevenci infekcí.

Bacillol® 30 Foam

Vlastnosti přípravku
- dezinfekční roztok připravený ihned k použití
- působí rychle
- vynikající materiálová snášenlivost
- vhodný také pro citlivé materiály jako je Makrolon®, plexisklo a polysulfon
- výborně smáčí povrch
- praktická a snadná aplikace pomocí pěnovače
- bez barviv a parfemace

Složení
Ethanol 140 mg/g; propan-2-ol 100 mg/g; propan-1-ol 60 mg/g; N-alkylaminopropylglycin 5 mg/g.

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní, fungicidní na kvasinky, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), MNV*, rotavirus a polyomavirus
* Murine norovirus

Oblasti použití
Bacillol® 30 Foam je zejména vhodný na rychlou dezinfekci povrchů z citlivých materiálů, jako jsou např.:
- zdravotnické pomůcky a vybavení specifikované zákonem o zdravotnických prostředcích
- citlivé syntetické povrchy jako jsou syntetická kůže, Makrolon®, akrylové sklo a polysulfon
- pracovní plochy na klinikách, v primární zdravotní péči, zubní chirurgii a sanitách
- oblasti, které vyžadují rychlý účinek, například výrobní linky
- oblasti těžko přístupné, jako jsou displeje, monitory, klávesnice, ovládací panely apod.
- solária

Návod k použití
Bacillol® 30 Foam je připraven k okamžitému použití. Dostatečně smočte dezinfikovaný povrch přípravkem a rozetřete jej suchou jednorázovou utěrkou. Udržujte povrch vlhký po celou expoziční dobu. K zajištění stejnoměrné aplikace použijte speciálně vyvinutý pěnovač, který navíc umožní optickou kontrolu pokrytí povrchu přípravkem.
Pro dezinfekci svislých povrchů, např. displejů a monitorů nebo nerovných ploch, jako jsou klávesnice a ovládací panely, doporučujeme nastříkat dostatečné množství přípravku Bacillol® 30 Foam na čistou jednorázovou utěrku a důkladně jí otřít dezinfikovaný povrch.

Ujistěte se prosím, že se dezinfekční roztok nedostal dovnitř zařízení. Před aplikací si přečtěte důkladně návod k použití dezinfikovaného přístroje pro bližší informace. Nepoužívejte pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Množství použitého dezinfekčního roztoku nesmí být vyšší než 50 ml na m^2 ošetřované plochy. Celkové množství přípravku použitého v jedné místnosti nesmí být vyšší než 100 ml na m^2 podlahy místnosti.

Zabraňte vniknutí nezředěného přípravku do kanalizace.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku.

Dávkování
Dezinfekce otřením

Baktericidní/Fungicidní na kvasinky[1]	
– špinavé podmínky	konc. – 30 s[2]
	konc. – 5 min[3]
Virucidní na obalené viry. (vč. HBV, HIV, HCV)	konc. – 30 s
MNV[4]	
– čisté podmínky	konc. – 5 min
– špinavé podmínky	konc. – 10 min
Polyomavirus	konc. – 5 min
Rotavirus	konc. – 1 min

1) podle nových standardních metod; s mechanickým účinkem
2) rychlá dezinfekce
3) seznam VAH
4) Murine norovirus

Klasifikace
Zdravotnický prostředek

Balení

Obj. číslo	Balení	Kartón
981126	láhev 750 ml	8 ks
981127	kanystr 5 l	1 ks

Pěnovač k láhvi 750 ml

980036	1 ks

Na základě rozsáhlých testů účinnosti a vědecky podloženého výzkumu a vývoje zajišťuje Systém Hygieny HARTMANN nejvyšší kvalitu.

Výzkumem k prevenci infekcí. www.bode-science-center.com

03.2012